

# COMPO EXPERT Basfoliar® 36 Extra SL

specijalno tekuće N-gnojivo (27 % N) s magnezijem (3 % MgO)  
i mikroelementima

## SASTAV

27 % N	ukupni dušik 18,7 % amidni dušik – urea (NH <sub>2</sub> ) 4,7 % nitratni dušik (NO <sub>3</sub> ) 3,6 % amonijski dušik (NH <sub>4</sub> )
3 % MgO	magnezijev oksid
0,02 % B	bor
0,2 % Cu	bakar*
0,02 % Fe	željezo*
1 % Mn	mangan*
0,005 % Mo	molibden
0,01 % Zn	cink*

\*u kelatnom (EDTA) obliku

**PAKIRANJE** 20 L (26 kom/EP)

## KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI KORIŠTENJA

- ✓ **Basfoliar® 36 Extra SL** je posebno pogodan u intenzivnoj proizvodnji poljoprivrednih kultura (povrće, voće, vinova loza, hmelj, žitarice i sl.) kao nadopuna osnovnoj gnojidbi za postizanje većih prinosa, osobito kada pored visokih potreba za dušikom postoji i visoka potreba za magnezijem i manganom
- ✓ **Prednost prilikom sušnih perioda** kada se granulirana gnojiva ne tope, te na tlima s visokim pH gdje dolazi do fiksacije mangana → osigurava opskrbljenost biljaka magnezijem, manganom i drugim mikroelementima
- ✓ Primjena rezultira **povećanjem prinosa**, ali i **pozitivnim učinkom na kvalitativna svojstva usjeva (povećanje % škroba u krumpiru, % šećera u šećernoj repi, % proteina i glutena u pšenici)**
- ✓ Svi metalni mikroelementi (Mn, Fe, Cu, Zn) u obliku EDTA kelata
- ✓ Može se miješati s većinom sredstava za zaštitu bilja, što smanjuje troškove aplikacije
- ✓ Ne miješati s mineralnim uljima i jako alkalnim sredstvima

**Prilikom jakog napada uzročnika bolesti, štetnika ili tuče, obavezno primijeniti radi brze regeneracije lisne mase!**



## PREPORUKE ZA PRIMJENU

Doziranje ovisi o specifičnim zahtjevima usjeva i vremenu primjene. Broj prskanja Basfoliar® 36 Extra SL ovisi o broju prskanja sredstvima za zaštitu bilja, zbog čega je dozu potrebno prilagoditi broju tretiranja sredstvima za zaštitu bilja.

KULTURA	DOZIRANJE (folijarna aplikacija)
<b>VINOVA LOZA</b>	Prskanje maksimalno 4,5 l/ha (0,5%)
<b>VOĆE<sup>1)</sup></b>	
jezgričavo voće <sup>2)</sup> , citrusi	4-6 l/ha (maksimalna koncentracija otopine 0,5-0,8%)
koštičavo voće <sup>3)</sup>	3,5-4,5 l/ha (0,25-0,3%)
jagoda <sup>3)</sup>	3-3,5 l/ha (0,2-0,25%)
ribizle, maline, kupine, borovnice <sup>3)</sup>	2,25 l/ha (0,25%)
ogrozd <sup>3)</sup>	1,5 l/ha (0,1%)
<b>POVRĆE</b>	
salata	2-4 l/ha (0,75-1%)
špinat, blitva, celer, korabica	4-6 l/ha (1-2%)
mrkva, peršin, luk	3-4 l/ha (0,5-1%)
kupus, cvjetača	6-8 l/ha (2%)
kineski kupus	2-3 l/ha (0,5%)
rajčica, paprika	3-6 l/ha (0,75-1%)
krastavci (kornišoni)	2-6 l/ha (0,5-1%)
grašak	3,2-4 l/ha (0,8-1%)
grah	4-6 l/ha (1%)
<b>RASADNICI</b>	3-4 l/ha (0,5%)
<b>ŽITARICE</b>	6-8 l/ha (1-2%) - od sredine busanja BCCH 25-30 do sredine vlatanja BCCH 32-37
<b>KUKURUZ</b>	6-8 l/ha (1-2%) - od stadija 2 lista BCCH 13-14 do zatvaranja redova BCCH 32-34
<b>KRUMPIR</b>	3-4 l/ha (1-2%) - od stadija 2 lista BCCH 13-14 do zatvaranja redova BCCH 45-55
<b>ŠEĆERNA REPA</b>	4-8 l/ha (1-2%) - od stadija 2 lista BCCH 10-14 do zatvaranja redova BCCH 32-37
<b>ULJANA REPICA</b>	4-6 l/ha (1-2%) ili 3 x 4 l - od kraja razvoja postranih izboja BCCH 25-30 do sredine faze izduživanja stabljike BCCH 32-37
<b>SUNCOKRET</b>	4-6 l/ha (1-2%) - od stadija 4 lista do visine 80 cm, 2-3 aplikacije u kombinaciji sa sredstvima za zaštitu bilja
<b>ZRNATE MAHUNARKE</b>	6-8 l/ha (1-2%), 1 x prije cvatnje i 2 x nakon cvatnje (do tvorbe mahune) s razmakom 10-14 dana
<b>HME LJ</b>	7,5 l/ha (0,5%)

### Napomene

- 1) Kod raspršivanja je koncentraciju potrebno prilagoditi tipu uređaja koji se koristi.
- 2) Kod sorti jabuka osjetljivih na hrđu, npr. Zlatni delišes, s prskanjem započeti tek kada plodovi dosegnu veličinu oraha.
- 3) Ukoliko se koriste manje količine vode, ne smije se povećati koncentracija.