

COMPO EXPERT

Basfoliar® B flo

visoko koncentrirana suspenzija bora (B) za folijarnu primjenu
s preventivnim i kurativnim učinkom

SASTAV

13 % B	bor
--------	-----

PAKIRANJE 1 L (480 kom/EP)

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI KORIŠTENJA

Basfoliar® B flo je koncentrirana suspenzija bora (13 % B) za preventivne i kurativne tretmane. **Osigurava opskrbu usjeva borom i sprječava pojavu nedostatka posebice bitnim:**

- ✓ u usjevima s visokim potrebama za borom (B)
- ✓ na lakim pjeskovitim tlima
- ✓ na tlima siromašnim organskom tvari
- ✓ na tlima s visokim pH gdje je usvajanje bor blokirano
- ✓ u uvjetima suhog tla i visoke vlage zraka kada je translokacija bora u plodove i cvjetove oslabljena



Mikročestice unutar suspenzije su manje od 10 µm, lako se dispergiraju unutar otopine, a zahvaljujući ujednačenosti, ravnomjerno rasprše i po tretiranoj površini te ih biljka lako usvaja.

- ✓ Dokazano kurativno djelovanje
- ✓ Zbog niske EC vrijednosti ne postoji rizik od pojave fitotoksičnosti

Bor je u ishrani biljaka važan jer povoljno utječe na

- ✓ izgradnju staničnih stjenki
- ✓ pravilan rast i izduživanje biljnih tkiva
- ✓ transport i sintezu ugljikohidrata.

Osim toga biljke dobro opskrbljene borom pokazuju bolju diferencijaciju pupova te zameću veći broj plodova.

Basfoliar® B flo poboljšava zemetanje plodova i dozrijevanje plodova visoke kvalitete te osigurava najkvalitetniju opskrbu biljaka borom.

PREPORUKE ZA PRIMJENU

Doziranje ovisi o specifičnim zahtjevima usjeva i vremenu primjene.

KULTURA	DOZA (folijarno)	FAZA PRIMJENE
RATARSTVO		
Kukuruz	3 L/ha uz 200 L vode/ha	Jedan tretman u fazi 6-8 lista. Kod srednjeg do većeg nedostatka bora ponoviti tretman nakon 10-14 dana.
Soja	2 L/ha uz 200 L vode/ha	Jedan tretman s 2 L/ha kada usjev dosegne visinu od 10-15 cm. Po potrebi, ponoviti uz razmake od 10-14 dana između tretmana.
Suncokret	2 L/ha uz 200 L vode/ha	Tretirati od faze 2 para lista do faze butonizacije. Po potrebi, ponoviti tretman unutar navedenog razdoblja uz razmak od 10-14 dana između tretmana.
Uljana repica	1 L/ha uz 220-400 L vode/ha	1. tretman uz zaštitu bilja u fazi 3-5 listova (BBCH 13-15). 2. tretman s tretmanom protiv repičine pipe i uzročnika bolesti.
Šećerna repa	2-3 L/ha uz 50-200 L/ha	2-3 L/ha u fazi 4-6 listova. Kod srednjih i visokih nedostataka bora, tretman je potrebno ponoviti u istoj dozi uz razmake od 10-14 dana između tretmana.
Hmelj	1.5 L/ha uz 500 L/ha	Primijeniti kod visine usjeva od 2.5 m.
POVRČARSTVO		
Krumpir	1-2 L/ha uz 200 L vode/ha	Primijeniti tjedan dana nakon potpunog nicanja biljaka. Kod srednjeg do većeg nedostatka bora ponoviti tretman nakon 10-14 dana. Treća aplikacija u fazi punjenja gomolja ako je analizom lista indiciran nedostatak bora.
Kupusnjače (kupus, cvjetača, brokula...)	1.5-3 L/ha uz 200 L vode/ha	Jedan tretman u fazi 4-6 lista. Po potrebi, ponoviti uz razmake od 10-14 dana između tretmana.
Mrkva	1.5-3 L/ha uz 200 L vode/ha	Jedan tretman kad lisna masa dosegne visinu od 10-15 cm. Po potrebi, ponoviti uz razmake od 10-14 dana između tretmana.
Luk	1-2 L/ha uz 200 L vode/ha	Primijeniti čim postoji dovoljno razvijene lisne mase. Po potrebi, kod srednjeg i većeg nedostatka bora, ponoviti tretman nakon 10-14 dana.
Celer	1,5-3 L/ha uz 200 L vode/ha	Jedan tretman u fazi 4-6 lista. Po potrebi, kod srednjeg i većeg nedostatka bora, ponoviti tretman nakon 10-14 dana.
Poriluk	1,5-2 L/ha uz 200 L vode/ha	Primijeniti 2 tjedna nakon presađivanja, kod direktne sjetve kad lisna masa dosegne visinu od 15 cm. Kod srednjeg i većeg nedostatka bora, ponoviti tretman jedan ili dva puta uz razmak od 10-14 dana između tretmana.
Grah, grašak	2 L/ha uz 200 L vode/ha	Primijeniti kad usjev dosegne visinu od 10-15 cm. Po potrebi, kod srednjeg i većeg nedostatka bora, ponoviti tretman nakon 10-14 dana
Šparoga	3 L/ha uz 200 L vode/ha	Tretirati lisnu masu krajem vegetacije, pred odumiranje lisne mase.
Cikla	2,5-3 L/ha uz 200 L vode/ha	Primijeniti u fazi 4-6 razvijena lista. Kod većeg nedostatka bora ponoviti tretman u razmacima od 10-14 dana.
Bundeva, tikvica	2 L/ha uz 200 L vode/ha	Primijeniti u fazi 4 razvijena lista. Po potrebi, ponoviti tretman uz razmak od 10-14 dana između tretmana.

KULTURA	DOZA (folijarno)	FAZA PRIMJENE
VINOVA LOZA I VOĆKE		
Vinova Loza	1-2 L/ha uz 200-1.000 L vode/ha	1. tretman s 1-1.5 L/ha kada je cvat vidljiv, 2. tretman s 1-1.5 L/ha prilikom razdvajanja cvjetova 3. tretman s 1-2 L/ha nakon berbe prije otpadanje lišća.
Maslina	1-2 L/ha uz 200-1.000 L vode/ha	1. tretman s 1-2 L/ha prilikom otvaranja pupova. 2. tretman s 1-2 L/ha na početku cvatnje.
Jabuka, kruška	1-2 L/ha uz 500-1.000 L vode/ha	1. tretman s 1-2 L/ha u fazi rožnatog pupa. 2. tretman s 1-2 L/ha na početku cvatnje 3. tretman s 2 L/ha nakon berbe prije otpadanje lišća.
Trešnja, šljiva	1-2 L/ha uz 500-1.000 L vode/ha	1. tretman s 1-2 L/ha u fazi zimskog pupa/mirovanja. 2. tretman s 2 L/ha u fazi rožnatog pupa. 3. tretman s 2 L/ha nakon berbe prije otpadanje lišća.
ŠUMARSTVO		
Četinjače	1,5-2 L/ha uz 500-1.000 L vode/ha	1. tretman u proljeće kada krene formiranje novih iglica 2. tretman u ranu jesen

Napomena: Basfoliar® Bor flo može se miješati s većinom sredstava za zaštitu bilja, no obavezno prije primjene provjerite kompatibilnost proizvoda i mogućnost miješanja s Vašim prodajnim savjetnikom.

Za uspješnu folijarnu prihranu i zaštitu usjeva uz sve tretmane obavezno je dodati neionski okvašivač **Vitalis Rapid WTX** u dozi 0,2 L/ha.

S povjerenjem nam se obratite za stručne savjete prilagođene Vašim potrebama