

# COMPO EXPERT Basfoliar® Combi-Stipp SL

**specijalno kalcijevo gnojivo** s dodatkom dušika, magnezija i mikroelemenata (B, Zn, Mn) za prevenciju nedostataka kalcija u uzgoju voća i povrća

## SASTAV

9,1 % N	ukupni dušik 8,7 % N u nitratnom obliku (NO <sub>3</sub> ) 0,4 % N u amidnom obliku (NH <sub>2</sub> )
14,8 % CaO	kalcijev-oksidi
1 % MgO	magnezijev-oksidi
0,2 % B	bor
0,01 % Zn	cink*
0,4 % Mn	mangan*

\*u kelatnom (EDTA) obliku



**PAKIRANJA** 10 L (40 kom/EP)  
20 L (24 kom/EP)

## KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI KORIŠTENJA

Basfoliar® Combi-Stipp SL je tekuće **kalcijevo gnojivo** (+ N, Mg, B, Zn, Mn) za prevenciju pojave nedostataka kalcija u povrću i voću i time povezanih fizioloških poremećaja.

✓ Redovitom primjenom **sprječavaju se fiziološki poremećaji kao što su:**

- pojava gorkih pjega kod jabuka,
- vršna trulež plodova rajčice i paprike
- fiziološke truleži lista salate i drugog lisnatog povrća
- pucanje plodova

✓ Znatno poboljšava kvalitetu plodova i utrživih dijelova biljke pa se preporučuje primjena u svim poljoprivrednim kulturama

✓ Izuzetno efikasan u preventivnoj i kurativnoj primjeni

✓ Sadrži bitne mikroelemente:

- **bor** → s Ca utječe na stabilizaciju staničnih stijenki; bitan za tvorbu jake i elastične pokožice ploda; bolji transport šećera unutar biljke
- **mangan** → potreban za sintezu klorofila i vitamina C; utječe na bolju obojenost plodova
- **cink** → sastavni dio enzima; bitan za fotosintezu i sintezu fitohormona (npr. auksina)

## Prednosti folijarne primjene Basfoliar® Combi-Stipp-a:

- ✓ brzo usvajanje od strane plodova i lišća
- ✓ stabilizacija i stvaranje čvršće stanične stijenke rezultira kvalitetnijim plodovima koji se mogu duže čuvati
- ✓ veći prinos plodova I. klase
- ✓ veća tolerantnost biljke prema uzročnicima bolesti i štetnicima
- ✓ manji stres izazvan pojavom visokih temperatura

KULTURA	DOZA	MAKS. KONC.	BROJ PRIMJENA	INTERVAL PRSKANJA	PREPORUKE
JABUKA sprječavanje pojave gorkih pjega	3-6 l/ha	0,2-0,5 %	6-8 puta	12-14 dana	S prskanjem krenuti u vrijeme zemetanja plodova (plodovi veličine lješnjaka), a završiti kratko pred berbu. U prvom tretiranju koristiti niže preporučene količine.
JABUKA sprječavanje pojave pjegavosti i opadanja lišća	3-4 l/ha	0,2-0,5 %	3-5 puta	14 dana	S prskanjem krenuti u vrijeme zemetanja plodova (plodovi veličine lješnjaka), a završiti kratko pred berbu. U prvom tretiranju koristiti niže preporučene količine.
TREŠNJA	3,5 l/ha	0,2-0,3 %	2-3 puta	14 dana	S prskanjem krenuti nakon cvatnje i ponoviti 2-3 x u kombinaciji s fungicidima.
JAGODA	1,5-4,5 l/ha	0,2-0,4 %	4-5 puta	7 dana	S prskanjem krenuti u cvatnji i ponoviti 2-3 x u kombinaciji s fungicidima.
SALATA	2,5 l/ha	0,5 %	2 puta	7-14 dana	S prskanjem krenuti nakon ukorjenjivanja.
KUPUSNJAČE	3-5 l/ha	1 %	3-5 puta	7-14 dana	S prskanjem krenuti prije formiranja glavica.
PLODOVITO POVRĆE rajčica, paprika, krastavac	2-3 l/ha	0,1-0,3 %	5-6 puta	7-14 dana	S prskanjem početi u cvatnji; kasnije uz fungicide koji se primjenjuju.
LUK	3-4 l/ha	0,5-1 %	3-4 puta	7-14 dana	Od faze 4 prava lista do sredine glavičanja.
MRKVA	2-3 l/ha	0,5-1 %	2-3 puta	7-14 dana	Od faze 4-5 listova do faze sredine punjenja korijena.

### Napomene

Basfoliar® Combi-Stipp SL pogodan je za primjenu sa sredstvima za zaštitu bilja, no obavezno je prije primjene napraviti test kompatibilnosti.

Ne miješati s mineralnim uljima i jako alkalnim sredstvima.

Kod miješanja sa sredstvima za zaštitu bilja prvo dodati Basfoliar® Combi-Stipp SL, zatim dodati sredstvo za zaštitu bilja.

Najbolji učinak se postiže primjenom ujutro ili navečer.



S povjerenjem nam se obratite za stručne savjete prilagođene Vašim potrebama