

COMPO EXPERT Basfoliar® Fruits SL

specijalno tekuće gnojivo s **fosfitima**, posebno formulirano za vitalnost i jačanje otpornosti raznih usjeva

SASTAV

40 % P ₂ O ₅	fosfor-pentoksid → u obliku kalijevih-fosfita
15 % K ₂ O	kalijev-oksidi
5 % MgO	magnezijev-oksidi
0,01 % B	bor
0,05 % Fe	željezo*

*u kelatnom (EDTA i EDDHA) obliku



PAKIRANJE 10 L (40 kom/EP)

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI KORIŠTENJA

Basfoliar® Fruits SL je specijalno visokokoncentrirano tekuće PK 40-15 gnojivo s dodatkom magnezija, bora i željeza **za jačanje otpornosti raznih usjeva**.

S visokim sadržajem fosfora (40 % P₂O₅) u obliku kalijevih-fosfita potiče prirodnu otpornost biljaka na uzročnike bolesti poput **krastavosti ili fuzikladija jabuke (*Venturia spp.*), *Phytophthora spp.* i plamenjače (*Peronospora spp.*)**.

→ dva vrlo bitna načina djelovanja fosfita: inhibiraju oksidativnu fosforilaciju u metabolizmu uzročnika bolesti te stimuliraju sintezu i otpuštanje hormona stresa, tzv. fitoaleksina, koji potiču prirodne obrambene mehanizme unutar biljke

- ✓ **Visoka učinkovitost, osobito u uvjetima visoke vlage, kada je i viši stupanj pojave uzročnika bolesti**
- ✓ **Kompatibilan s većinom fungicida za naprednu zaštitu bilja (*Peronospora spp.*, *Phytophthora spp.*, *Venturia spp.*)**

DODATNA PREDNOST: Basfoliar® Fruits SL **smanjuje pH vode u traktorskoj prskalici** čime se povećava djelotvornost većine primjenjenih fungicida i insekticida!

- ✓ Željezo (Fe) potpuno kelirano s EDTA i EDDHA → sigurna opskrba i u uvjetima visokog pH tla
- ✓ Idealan za primjenu u povrćarstvu, vinogradarstvu, voćarstvu, rasadničarstvu, ratarstvu i na travnjacima → jednostavna folijarna aplikacija ili primjena putem tla (sistem kap na kap, fertirigacija)

PREPORUKE ZA PRIMJENU

Doziranje ovisi o specifičnim zahtjevima usjeva i vremenu primjene.

KULTURA		DOZIRANJE
KRUMPIR		4-5 l/ha, primijeniti u više navrata
VINOVA LOZA	od prije cvatnje do zatvaranja grozda (BBCH 60-79)	3-4 l/ha, primijeniti u više navrata u kombinaciji sa sredstvima za zaštitu bilja
POVRĆE	presadnice	1-2 l/ha (0,8-1 %)
rajčica, paprika	od sadnje sve dok plodovi ne krenu mijenjati boju	3-4 l/ha, primijeniti u više navrata
krastavac	od sadnje	2.5 l/ha, primijeniti u više navrata s razmakom od 14 dana
salata	presadnice prije sadnje	zalijevanje: 0,2-0,3 %
	nakon sadnje	2,5 l/ha, primijeniti u više navrata
kupusnjače		3-4 l/ha
luk, poriluk, vlasac		3-5 l/ha, primijeniti u više navrata
peršin, mrkva, celer		3-5 l/ha, primijeniti u više navrata
VOĆE	opća preporuka	2-3 l/ha, primijeniti u više navrata
jabuke, kruške	od cvatnje do promjene boje plodova	2-3 l/ha, primijeniti u više navrata u kombinaciji sa sredstvima za zaštitu bilje potapanje sadnica: 0,3-0,5 % ca. 10 min
jagoda	nakon sadnje (8- 14 dana) i u jesen (od listopada)	prskanje: 7-10 l/ha uz min. 1000 l vode potapanje sadnica: 0,2-0,4 %-na otopina, ca. 10 minuta
	proljeće – od cvatnje do zametanja plodova	prskanje: 1.5-2.5 l/ha, 1-2 puta
	fertirigacija	4-6 l/ha, 3-4 puta od početka vegetacije do pojave plodova
	frigo sadnice prije sadnje	potapanje sadnica: 0,2-0,4 %-na otopina, ca. 10 minuta
	nakon sadnje	prskanje: 3-4 l/ha, min. 1000 l vode
TRAVNJACI		10 l/ha u 600-1.000 l vode, 2-3 puta tijekom sezone
UKRASNO BILJE i RASADNICI	opća preporuka	0,5-0,6 %, s razmakom od 10-12 dana
Rhododendroni, četinjače		0,5-0,6 %, s razmakom od 10-14 dana
Calluna, Erica	mlade sadnice	0,2 %, s razmakom od 14 dana
	lončanice	0,2-0,3 %, s razmakom od 14 dana

Napomena: Basfoliar® Fruits SL pogodan je za primjenu sa sredstvima za zaštitu bilja, no preporučljivo je prije primjene napraviti test kompatibilnosti na manjoj površini. Kod miješanja sa sredstvima koja sadrže kalcij, sumpor i/ili magnezij te miješanja s bakrenim preparatima, mineralnim uljima i jako alkalnim sredstvima, obavezno je prije primjene napraviti test kompatibilnosti.