

# COMPO EXPERT

## Basfoliar® NK Plus 11-0-39

koncentrirana suspenzija dušika i kalija s produženim učinkom  
za kvalitetnije i otpornije usjeve

### SASTAV

11 % N	ukupni dušik 11 % N u nitratnom obliku (NO <sub>3</sub> )
39 % K <sub>2</sub> O	kalijev-oksid



**PAKIRANJE** 5 L (160 kom/EP)

### KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI KORIŠTENJA

Basfoliar® NK Plus je **visokokoncentrirana tekuća suspenzija dušika i kalija** za poboljšanje kvalitete i jačanje otpornosti usjeva.

Posebice je bitan u završnim fazama razvoja i dozrijevanja poljoprivrednih kultura za postizanje visokih prinosa odlične kvalitete.

**Suspenzija** bolje prianja na lisnu površinu čime se optimizira usvajanje hranjiva i produžuje razdoblje učinkovitosti folijarne gnojide.

#### S visokim sadržajem kalija (39 % K<sub>2</sub>O)

##### ✓ Kalij je ključan čimbenik tvorbe kvalitete plodova.

Pravilna i dostatna opskrba biljaka kalijem (osobito u ključnim momentima razvoja i rasta plodova) pozitivno utječe na bitne čimbenike kvalitete plodova kao što su veličina, boja, oblik i aroma plodova (balansirani sadržaj šećera i kiselina) čime plodovi dobivaju na većoj tržišnoj vrijednosti. Također, kalij ima pozitivan utjecaj na čvrstoću biljnog tkiva čime se poboljšavaju skladišna i transportna svojstva plodova.

##### ✓ Kalij povećava otpornost biljaka na ekološke stresove.

Biljke koje su dobro opskrbljene kalijem su otpornije na vodne stresove (sušu i suvišak vode), visoke i niske temperature, napade štetnika, uzročnika bolesti i nematoda.

Basfoliar® NK Plus je idealan za folijarnu primjenu u **povrćarstvu, vinogradarstvu, voćarstvu, ratarstvu, rasadničarstvu i cvjećarstvu** → jednostavna folijarna aplikacija. **Kompatibilan je s većinom fungicida za naprednu zaštitu bilja.**

## PREPORUKE ZA PRIMJENU

Doziranje ovisi o specifičnim zahtjevima usjeva i vremenu primjene.

KULTURA	DOZIRANJE (folijarna aplikacija)
<b>POVRĆE</b>	
salata	2,5 l/ha (0.75-1 %) u fazi intenzivnog porasta, primijeniti 1 put
celer, mrkva, peršin	2,5-3 l/ha (1-2 %) u fazi intenzivnog rasta korijena, primijeniti 1-2 puta
luk	2,5 l/ha (1 %) u fazi intenzivnog debljanja lukovica (period između 25.06.-25.07.), primijeniti 2 puta
kupusnjače	2-3 l/ha (0.5-1 %) u fazi intenzivnog porasta glavice, primijeniti 2 puta
rajčica, paprika	2,5-3 l/ha (0.75-1 %) od zametnute 5. etaže, primijeniti 2-3 puta
krastavci (kornišoni)	2-2,5 l/ha (0.5-1 %) u fazi intenzivnog porasta/vegetacije, primijeniti 2-3 puta u razmacima 10-12 dana
grašak, grah	2-2,5 l/ha (0.8-1 %) u fazi nalijevanja mahuna, primijeniti 1-2 puta
<b>VOĆE</b>	
jabučasto voće (jabuka, kruška, dunja, mušmula, oskoruša)	2,5-3 l/ha (0.5-0.8 %) u fazi intenzivnog porasta plodova
koštičavo voće (breskva, marelica, šljiva, trešnja, višnja)	2-2,5 l/ha (0.25-0.3 %) tijekom nalijevanja plodova, primijeniti 2-3 puta
jagoda	1-2.5 % u fazi intenzivnog porasta i sazrijevanja plodova, primijeniti 2-3 puta
<b>MASLINA</b>	2,5-3 l/ha (1-2 %) tijekom intenzivnog punjenja plodova, primijeniti 2 puta
<b>VINOVA LOZA</b>	2-2,5 l/ha (0.8-1 %) u fazi nalijevanja bobica
<b>RASADNICI</b>	0.5 % primijeniti 1-2 puta tijekom vegetacije
<b>KRUMPIR</b>	2,5-3 l/ha (1-2 %) u fazi intenzivnog punjenja gomolja, primijeniti 2-3 puta

Basfoliar NK Plus pogodan je za primjenu sa sredstvima za zaštitu bilja, no prije primjene potrebno je napraviti test kompatibilnosti na manjoj površini.