

# COMPO EXPERT

## Basfoliar® Zn flo

visoko koncentrirana suspenzija cinka (Zn) za folijarnu primjenu  
s preventivnim i kurativnim učinkom

### SASTAV

75 % Zn	cink
4,1 % N	ukupni dušik 4,1 % N u amidnom obliku (NH <sub>2</sub> )

**PAKIRANJE** 1 L (480 kom/EP)

### KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI KORIŠTENJA

Basfoliar® Zn flo je koncentrirana suspenzija cinka (75 % Zn) za preventivne i kurativne tretmane u svim usjevima, osobito kulturama s visokim potrebama za cinkom (Zn).

**Osigurava opskrbu usjeva cinkom i sprječava pojavu nedostatka posebice bitnim na na teškim, karbonatnim i alkalnim tlima** gdje je usvajanje cinka iz tla otežano ili potpuno blokirano

- ✓ Mikročestice unutar suspenzije su manje od 10 µm, lako se dispergiraju unutar otopine, a zahvaljujući ujednačenosti, ravnomjerno rasprše i po tretiranoj površini te ih biljka lako usvaja
- ✓ **Dokazano kurativno djelovanje**
- ✓ Zbog niske EC vrijednosti ne postoji rizik od pojave fitotoksičnosti

Basfoliar® Zn flo osigurava opskrbu biljaka cinkom koji povoljno utječe na rad enzima, fotosintezu i sintezu fitohormona (npr. auksina) te **poboljšava kvalitetu plodova i lisne mase.**



## PREPORUKE ZA PRIMJENU

Doziranje ovisi o specifičnim zahtjevima usjeva i vremenu primjene.

KULTURA	DOZA (folijarno)	FAZA PRIMJENE
<b>RATARSTVO</b>		
Kukuruz	1 l/ha u 200 L vode	Primijeniti u fazi 4-6 razvijana lista (V4-V6)
Pšenica, zob, ječam	0,5- 1 L/ha uz 200 L vode/ha	1. tretman s 1 L/ha od faze 2 lista do pojave drugog nodija (BBCH 12-32) 2. tretman s 0,5 L/ha od kraja klasanja do kraja cvatnje (BBCH 59-69)
Uljana repica	1 L/ha uz 200 L vode/ha	Primijeniti u fazi 4-9 razvijena lista.
Šećerna repa	1 L/ha uz 200 L vode/ha	Primijeniti u fazi 3-6 razvijena lista. Po potrebi kod većeg nedostatka cinka, ponoviti tretiranja u intervalima od 10-14 dana.
Hmelj	1,5 L/ha uz 500 L vode/ha	Kada usjev dosegne visinu od 2,5 m.
<b>POVRČARSTVO</b>		
Krumpir	1 L/ha uz 200 L vode/ha	Primijeniti tjedan dana nakon potpunog nicanja biljaka. Po potrebi, kod većeg nedostatka cinka, ponoviti tretiranja u intervalima od 10-14 dana. Također, tretman u fazi punjenja gomolja ako je analizom lista indiciran nedostatak cinka.
Kupusnjače	1 L/ha uz 200 L vode/ha	Primijeniti u fazi 4-9 razvijena lista.
Mrkva	1 L/ha uz 200 L vode/ha	Primijeniti kad lisna masa dosegne visinu od 10-15 cm. Po potrebi, kod većeg nedostatka cinka, ponoviti uz razmake od 10-14 dana između tretmana.
Luk	1 L/ha uz 200 L vode/ha	Primijeniti čim postoji dovoljno razvijene lisne mase za upijanje gnojiva.
Celer	1 L/ha uz 200 L vode/ha	Primijeniti u fazi 4-6 lista. Po potrebi, kod većeg nedostatka cinka, ponoviti tretman nakon 10-14 dana.
Poriluk	1 L/ha uz 200 L vode/ha	Primijeniti 2 tjedna nakon presađivanja, kod direktne sjetve kad lisna masa dosegne visinu od 15 cm. Kod većeg nedostatka cinka, ponoviti tretman jedan ili dva puta uz razmak od 10-14 dana između tretmana.
Grah, grašak	0,5-1 L/ha uz 200 L vode/ha	Primijeniti kad usjev dosegne visinu od 10-15 cm. Po potrebi, kod srednjeg i većeg nedostatka cinka, ponoviti tretman nakon 10-14 dana

KULTURA	DOZA (folijarno)	FAZA PRIMJENE
<b>VINOVA LOZA I VOĆKA</b>		
Vinova loza	1 L/ha uz 200-1.000 L vode/ha	1. tretman kada je cvat vidljiv 2. tretman prilikom razdvajanja cvjetova 3. tretman na jesen
Maslina	0,7-1 L/ha	2 primjene tijekom rasta proljetnih izbojaka sve do pred cvatnju (primijeniti uz Basfoliar Bor Flo). Kod niskih razina cinka tretman ponoviti u jesen.
Jabuka, Kruška	1-2 L/ha uz 1.000 L vode/ha	1. tretman prilikom otvaranja pupova 2. tretman nakon cvatnje. Izbjegavati primjenu tijekom cvatnje. 3. tretman nakon berbe prije otpadanje lišća.
Trešnja, šljiva	1-2 L/ha uz 1.000 L vode/ha	1. tretman u fazi zimskog pupa/mirovanja. 2. tretman u fazi rožnatog pupa. 3. tretman nakon berbe prije otpadanje lišća.
Jagoda na otvorenom	0.25-0.5 L/ha uz 200-500 L vode/ha	1. tretman s 0.5 L/ha u fazi zelenog pupa 2. tretman s 0.25 L u fazi bijelog pupa. 3. tretman s 0.25 L/ha nakon berbe prilikom formiranja nove lisne mase.
<b>TRAVNJACI I ŠUMARSTVO</b>		
Travnjaci	1 L/ha uz 200 L vode/ha	Primijeniti čim krene vegetacija u proljeće. Po potrebi, ponoviti u intervalima od 10-14 dana.
Četinjače	1 L/ha uz 500-1.000 L vode/ha	1. primjena u proljeće kada krene vegetacija 2. primjena u ranu jesen

**Napomena:** Basfoliar® Zn flo može se miješati s većinom sredstava za zaštitu bilja, no obavezno prije primjene provjerite kompatibilnost proizvoda i mogućnost miješanja s Vašim prodajnim savjetnikom.

Za uspješnu folijarnu prihranu i zaštitu usjeva uz sve tretmane obavezno je dodati neionski okvašivač **Vitalis Rapid WTX** u dozi 0,2 L/ha.

S povjerenjem nam se obratite za stručne savjete prilagođene Vašim potrebama