

# COMPO EXPERT Nutribor®

koncentrirani folijarni mikroelementi (bor, mangan, molibden i cink)  
s dodatkom **dušika, magnezija i sumpora**

## SASTAV

8 % B	bor
1 % Mn	mangan*
0,04 % Mo	molibden
0,1 % Zn	cink*
6 % N	ukupni dušik 6 % N u amonijskom obliku (NH <sub>4</sub> )
5 % MgO	magnezijev-oksidi
22,5 % S	sumporov (III) oksid

\*metalni mikroelementi u kelatnom (EDTA) obliku



**PAKIRANJE** 15 kg (60 kom/EP)

## KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI KORIŠTENJA

Nutribor® je posebno folijarno gnojivo jedinstvenog sastava:

koncentrirani mikroelementi (bor, mangan, molibden i cink) s dušikom (N), magnezijem (Mg) i sumporom (S)


### S naglašenim sadržajem bora (8 % B) koji je bitan:

→ u kulturama koje zahtijevaju veću količinu bora, npr. **uljarice, šećerna i stočna repa, cikla, kupusnjače, špinat, salata, rajčica, jabuka i kruška, vinova loza, neke ukrasne biljke...**

→ u specifičnim proizvodnim uvjetima koji mogu dovesti do pojave nedostatka bora kao što su **alkalna tla (> pH), sušni uvjeti, pjeskovita tla i tla s niskim sadržajem organske tvari**

Posebnost Nutribor®-a leži također u uravnoteženoj opskrbi kultura drugim mikroelementima (mangan, molibden i cink) te dušikom (N), magnezijem (Mg) i sumporom (S), neophodnim za zdrave usjeve, više prinose i veću kvalitetu usjeva

- ✓ Izuzetno efikasan u preventivnoj i kurativnoj primjeni
- ✓ Odlična kompatibilnost s većinom sredstava za zaštitu bilja



Brojna ispitivanja su pokazala da primjena **Nutribor®**-a dovodi do značajnog povećanja prinosa !

## PREPORUKE ZA PRIMJENU

Doziranje ovisi o specifičnim zahtjevima usjeva, opskrbljenosti tla hranjivima i vremenu primjene.

KULTURA	DOZIRANJE (po aplikaciji)	Broj aplikacija tijekom vegetacije
ULJANA REPIKA	1-2 kg (0,6 %)	2
SUNCOKRET	1-2 kg (0,6 %)	2-3
ŠEĆERNA REPA, STOČNA REPA	1-2 kg (0,6 %)	3-4
KUKURUZ	1-1,5 kg (0,8 %)	2
KRUMPIR	1-2 kg (0,5 %)	2-3
DUHAN	1-2 kg (0,3 %)	3-4
MAHUNARKE	1-1,5 kg (0,5 %)	2-3
KUPUSNJAČE	1-2 kg (0,5 %)	2-3
RAJČICA, PAPRIKA	1-2 kg (0,3 %)	1-2
KRASTAVAC, DINJA, LUBENICA	1-2 kg (0,3 %)	2-3
MRKVA, CELER	1-2 kg (0,5 %)	2-3
JABUKA, KRUŠKA, AGRUMI	1-2 kg (0,4 %)	2-3
JAGODA	1-1,5 kg (0,5 %)	2-3
VINOVA LOZA	1-1,5 kg (0,3 %)	2-3

## Napomene

Kod primjene u mladim biljkama (faza 2 - 4 lista) potrebno je prepoloviti preporučene količine primjene (kod repa i uljane repice u tom slučaju maks. 0,5 kg/ha).

Pošto je bor u biljkama slabo pokretljiv, preporučljive su višekratne primjene (2-3 primjene), osobito u kulturama koje imaju visoke potrebe za borom (uljana repica, šećerna repa, kupusnjače...).